

Campagnol agreste

Microtus agrestis



Identification

- Ressemble beaucoup au Campagnol des champs en légèrement plus gros
- Mais : poil plus long et rude, queue nettement plus foncée sur le dessus qu'en dessous, et oreilles velues
- Deuxième molaire supérieure dotée vers l'intérieur d'un lobe supplémentaire n'existant pas chez les autres *Microtus*

Le Campagnol agreste fréquente généralement des milieux plus humides que ceux du Campagnol des champs avec une nette préférence pour les zones herbeuses à végétation haute. Il tolère une couverture buissonnante et arborée. On le trouve ainsi dans les vergers, les friches, les clairières, les haies, les taillis de feuillus peu denses, les talus des bocages.

Actif à toute heure, le Campagnol agreste l'est tout particulièrement au crépuscule et secondairement à l'aurore. Il creuse des galeries toujours superficielles, aussi son nid peut-il être découvert sur le sol, dissimulé sous une pierre. Son alimentation se compose principalement des parties vertes de plantes, d'écorces d'arbrisseaux, de graines.

Le cycle de reproduction de ce Rongeur s'effectue surtout entre mars et octobre. Les femelles mettent bas chaque année de 2 à 5 portées comprenant 3 à 8 jeunes. Leur maturité sexuelle est acquise à l'âge de 28 jours. Elles se reproduisent souvent dès l'année de leur naissance.

Les prédateurs de ce Rongeur sont les mêmes que ceux du Campagnol des champs : Carnivores, rapaces et serpents. Le Campagnol agreste représente en moyenne 10,3% des proies de la Chouette effraie.

Moins prolifique que le Campagnol des champs, il voit ses populations varier dans des proportions moindres. Aucune pullulation n'est signalée.

Cette espèce n'est pas menacée et ne jouit d'aucune mesure de protection particulière.

Toute la Normandie : très commun.

